



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Ufficio Legislativo

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0025475/GAB del 04/12/2014
Ufficio Legislativo

12 5
Q3107
SCR

All'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile
Avv. Paolo Panontin
Piazza Unità d'Italia, n. 1
TRIESTE
Via Sabbadini, n. 31
UDINE

Al Vicepresidente e assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
dott. Sergio Bolzonello
Via Trento, n. 2
TRIESTE
Via Sabbadini, n. 31
UDINE
Piazza Ospedale Vecchio, n. 11
PORDENONE

Alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
Area risorse agricole e forestali
Direttore di area
dott. Francesco Miniussi
Via Sabbadini, n. 31 -
UDINE

Al Servizio caccia e risorse ittiche
Dr. Marina Bortotto
Via Sabbadini 31
UDINE

Oggetto: **Caso EU-PILOT 6955/14/ENVI** – Calendari venatori – Rispetto degli articoli 2, 5 e 7 della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Come è noto, la Commissione europea ha avviato, nell'ambito del sistema di comunicazione UE-Pilot, il caso 6955/14/ENVI per violazione, fra gli altri, dell'articolo 7, comma 4, della direttiva

2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Detto articolo impone agli Stati membri di provvedere, in particolare, affinché le specie cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza, e, in particolare, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Risulterebbe, infatti, alla Commissione europea che, anche per la stagione di caccia 2014-2015, in numerose regioni italiane (Liguria, Toscana, Marche, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sicilia e Veneto), le specie tordo bottaccio, cesena e beccaccia possano essere cacciate fino al 31 gennaio, quando è già in corso la migrazione pre-nuziale.

Secondo il documento "Key Concepts of article 7(4) of directive 79/409/ECC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable species in the EU", adottato dalla Commissione europea nel 2001, che individua per le singole specie cacciabili e per ogni singolo Stato membro le date di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione pre-nuziale, la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione, per queste specie, in Italia inizierebbe, infatti, a partire dalla seconda decade di gennaio.

In ragione di ciò, la Commissione europea, al punto 1, lett. f), della richiesta EU-Pilot 6955/14/ENVI, chiede che le Autorità italiane, in particolare, chiariscano in che modo intendono garantire che le specie migratrici non siano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.


Si fa osservare che anche secondo la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n.157, elaborata dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 42 della legge comunitaria 2009, i calendari venatori in questione risulterebbero in contrasto con l'art. 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE, nonché con l'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che vieta, appunto, l'esercizio venatorio per ogni singola specie tutelata durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

In particolare, per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia, l'articolo 3, comma 1, lett. e), della legge 17 luglio 1996, n. 24, fissa al 31 gennaio 2015 la chiusura della caccia per le specie beccaccia, tordo bottaccio e cesena in contrasto con l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2009/147/CE, nonché con l'articolo 18, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Al fine di scongiurare la chiusura negativa del caso EU-PILOT in questione ed il conseguente avvio di una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea, si rende necessario che la stessa Regione modifichi tempestivamente il calendario venatorio, anticipando almeno al 20 gennaio 2015 il termine previsto per la chiusura della caccia alle specie sopra richiamate.

IL VICE CAPO VICARIO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

prof. Marcello Cecchetti





PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche Europee

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0009432 P-4.22.17.4.5
del 06/10/2014



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0020759/GAB del 07/10/2014

Ministero dell'Ambiente
Ufficio Legislativo

Ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it

DG Protezione della Natura

pnm-udg@minambiente.it

ISPRA

genovesi.piero@minambiente.it

c. p.c. *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari Regionali

segreteriacapodipartimento.affariregionali@governo.it

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Dirigente Area Affari comunitari e internazionali

ciaffi@regioni.it

Rappresentanza Permanente d'Italia

presso l'Unione europea

giur@rpue.esteri.it

Oggetto: Caso EU PILOT 6955/14/ENVI – Calendari venatori – Rispetto degli articoli 2, 5 e 7 della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, questa Struttura ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di informazioni, di seguito allegata, relativa alla non corretta applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. In particolare, per mezzo di svariate denunce, la Commissione è stata informata del fatto che le attività venatorie in varie Regioni Italiane potrebbero non essere compatibili con la legislazione UE applicabile. Risulterebbe, infatti, che 19 specie di uccelli in stato di conservazione non favorevole siano cacciate in Italia in assenza di Piani di Gestione/conservazione e che 9 specie di uccelli siano cacciate in Italia in fase di migrazione prenuziale.

Si rammenta che la richiesta della Commissione trova il suo fondamento nell'obbligo di leale cooperazione imposto agli Stati membri dall'art. 4, paragrafo 3 del TUE e che l'eventuale mancato rispetto di tale obbligo dà diritto alla Commissione di avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del TFUE, nei confronti dello Stato italiano.

Si sarà grati a codeste Amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, di voler

Dipartimento per le Politiche Europee - Struttura di Missione per le Procedure di infrazione.
Roma, Largo Chigi, 19 - CAP 00187. Telefono 06.6779.5208 - Fax 06.6779.5194.
E-mail: struttura@politicheeuropee.it

cortesemente inviare elementi di risposta alla segreteria della Struttura di missione per le procedure d'infrazione istituita presso il Dipartimento Politiche Europee (tel. 06 6779 5208, fax 06 6779 5194, email struttura@politicheeuropee.it), entro il 1° dicembre p.v., per il successivo inoltro ai competenti Servizi della Commissione europea nei termini previsti dal sistema EU Pilot.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

*Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti*



LM

*Dipartimento per le Politiche Europee - Struttura di Missione per le Procedure di infrazione.
Roma, Largo Chigi, 19 - CAP 00187. Telefono 06.6779.5208 - Fax 06.6779.5194.
Email: struttura@politicheeuropee.it*



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AMBIENTE

Direzione D - Applicazione, governance e semestre europeo

ENV.D.2 - Applicazione, politica di coesione e semestre europeo, Gruppo 2

Il Capo Unità

RICHIESTA EU PILOT 6955/14/ENVI

In fatto

Per mezzo di svariate denunce, la Commissione è stata informata del fatto che le attività venatorie in varie Regioni Italiane potrebbero non essere compatibili con la legislazione UE applicabile.

In particolare, risulterebbe che 19 specie di uccelli in stato di conservazione non favorevole sono cacciate in Italia in assenza di Piani di Gestione/conservazione e che 9 specie di uccelli sono cacciate in Italia in fase di migrazione prenuziale (vedasi grafici e tabelle in Allegato, riferite ai periodi 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014).

Legislazione europea

La Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici¹ (Direttiva Uccelli) concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento (Articolo 1).

L'Articolo 2 della Direttiva richiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'Articolo 1 a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

L'Articolo 5 richiede che, fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottino le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui

¹ GU L 20 del 26.01.2010, p. 7.

all'Articolo 1, che comprenda in particolare il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo.

L'Articolo 7 legge come segue:

"1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate all'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie elencate all'allegato II, parte A, possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie elencate all'allegato II, parte B, possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2.

Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.

Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione sulla caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia. "

Domande

1. Alla luce delle informazioni presentate in allegato, si prega di chiarire in che modo le autorità italiane intendono conformarsi agli obblighi derivanti dall'articolo 7 (4) della Direttiva Uccelli, in particolare:
 - a. In che modo le autorità Italiane intendono garantire che la caccia rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda la popolazione delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con l'obbligo di mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico a un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.
 - b. In riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione citate nell'allegato, i servizi della Commissione auspicano ricevere i dati dei carnieri realizzati, per le varie regioni, almeno per le ultime tre stagioni venatorie, nonché altri eventuali dati e informazioni per valutare la consistenza del prelievo venatorio su tali specie. Si prega di fornire anche informazioni su come tali dati di carnieri siano raccolti, pubblicati, analizzati ed utilizzati per la pianificazione dell'attività venatoria. Si chiede, inoltre, di chiarire come debbano essere annotati i capi abbattuti sul tesserino venatorio da parte del singolo cacciatore per le specie migratrici (ad esempio subito dopo l'abbattimento o a fine giornata?) e come vengano controllati (numero e frequenza dei controlli, risultati, sanzioni).
 - c. Per le summenzionate specie in cattivo stato di conservazione si prega di chiarire se esistono piani di gestione/conservazione (nazionali o regionali) (punti da 2.4.25 a 2.4.29 della Guida alla disciplina della caccia³). In caso affermativo, si prega di fornire i riferimenti a tale documentazione.
 - d. Si prega di chiarire se esistono studi, valutazioni, censimenti e monitoraggi sulla consistenza e la dinamica delle popolazioni oggetto di prelievo venatorio in Italia e sull'impatto che tale prelievo esercita, in particolare in riferimento alle specie in cattivo stato di conservazione sopra menzionate (punti 2.4.15 e

³ http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_it.pdf

- 2.4.16 della Guida alla disciplina della caccia³). Si prega, inoltre, di spiegare se e in che modo i dati summenzionati sono utilizzati per la formulazione di piani di prelievo (con i relativi limiti di carniere) commisurati alla consistenza effettiva delle popolazioni oggetto del prelievo.
- e. Si prega di chiarire in che modo le autorità Italiane intendono garantire che la caccia non sia praticata durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza.
 - f. Si prega di chiarire in che modo le autorità Italiane intendono garantire che le specie migratrici non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. In particolare:
 - i. Per quanto riguarda le specie Tordo bottaccio, Cesena e Beccaccia, risulta che siano cacciate in numerose regioni italiane (Liguria, Toscana, Marche, Friuli, Umbria, Sicilia, Toscana, Veneto) fino al 30 gennaio. Lo stesso articolo 18 della Legge 157/1992 prevede per queste specie un periodo di caccia fino al 31 gennaio. In base al documento sui Key Concepts⁴, per le suddette specie la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione inizia in Italia nella seconda decade di gennaio. Una stagione venatoria prolungata fino al 30 gennaio non sarebbe quindi coerente con tali date e quindi con l'articolo 7(4) della Direttiva Uccelli che vieta la caccia durante il ritorno al luogo di nidificazione. La Commissione auspica ricevere chiarimenti in merito.
 - ii. Si prega di indicare se anche altre specie sono state cacciate/sono cacciate nelle regioni italiane dopo l'inizio del periodo di ritorno al luogo di nidificazione indicato nel documento sui Key Concepts.
2. Si prega di chiarire se e in che modo la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge Comunitaria 2009, art. 42", redatta da ISPRA, è utilizzata dalle Regioni Italiane e se le stesse richiedono un parere a ISPRA prima dell'emanazione dei calendari venatori. A tal proposito si segnala che la Commissione è stata informata tramite denuncia del fatto che il calendario venatorio della Regione Sardegna 2011/2012 è stato annullato dal Consiglio di Stato,

³ http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/hunting_guide_it.pdf



⁴ http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/guidance_en.htm

proprio per non essere stato oggetto di un parere da parte di ISPRA prima della sua approvazione.

3. Si prega di fornire i calendari venatori di tutte le regioni italiane per la stagione 2013-2014, nonché i relativi pareri dell'ISPRA e i dati e le informazioni che sono stati utilizzati per verificare il rispetto dell'articolo 7(4) della Direttiva Uccelli.
4. Si prega di chiarire in che modo sono eseguiti i controlli per garantire il rispetto dei calendari venatori da parte dei cacciatori.

Infine, la Commissione desidera sapere se vi siano casi pendenti dinanzi l'autorità giudiziaria italiana per quanto riguarda i punti di cui sopra.

ALLEGATO








Tabella 1. Specie cacciate durante la migrazione prenuztiale e specie cacciate in cattivo stato di conservazione nelle Regioni Italiane nei periodi 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014.

Regione	Specie cacciate durante la migrazione prenuztiale		Specie cacciate in cattivo stato di conservazione	
Abruzzo	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 6. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 7. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 7. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 8. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 9. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 10. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 11. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 12. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 13. Tordora (<i>Streptopelia turtur</i>) 14. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 3. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 4. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 2. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 3. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 4. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 5. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 6. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 7. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 8. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 9. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 10. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 2. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 3. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 2. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 3. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 4. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 5. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 6. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 7. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 8. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 9. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 10. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 11. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
Basilicata	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 2. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 3. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>)

				<ol style="list-style-type: none"> 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 7. Sturna (<i>Perdix Perdix</i>) 8. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 9. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 10. Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>) 11. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 12. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 13. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 14. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 15. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 2. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 3. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 7. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 8. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 9. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 10. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 11. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 12. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 6. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 7. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Sturna (<i>Perdix Perdix</i>) 7. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 8. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 9. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 10. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 11. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 12. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 13. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
Calabria	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 4. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 5. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 6. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>)

				<ul style="list-style-type: none"> 7. Starna (Perdix Perdix) 8. Quaglia (Coturnix coturnix) 9. Pavoncella (Vanellus vanellus) 10. Frullino (Lymnocyptes minimus) 11. Beccaccino (Gallinago gallinago) 12. Beccaccia (Scolopax rusticola) 13. Tortora (Streptopelia turtur) 14. Allodola (Alauda arvensis)
	2012/2013:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (Anas crecca) 2. Canapiglia (Anas strepera) 3. Codone (Anas acuta) 4. Folaga (Fulica atra) 5. Beccaccia (Scolopax rusticola) 6. Cesena (Turdus pilaris) 7. Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 	2012/2013:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Marzaiola (Anas querquedula) 4. Mestolone (Anas clypeata) 5. Moriglione (Aythya ferina) 6. Quaglia (Coturnix coturnix) 7. Pavoncella (Vanellus vanellus) 8. Combattente (Philomachus pugnax) 9. Frullino (Lymnocyptes minimus) 10. Beccaccino (Gallinago gallinago) 11. Beccaccia (Scolopax rusticola) 12. Tortora (Streptopelia turtur) 13. Allodola (Alauda arvensis)
	2013/2014:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (Anas crecca) 2. Canapiglia (Anas strepera) 3. Codone (Anas acuta) 4. Folaga (Fulica atra) 5. Beccaccia (Scolopax rusticola) 6. Cesena (Turdus pilaris) 7. Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 8. Tordo Sassello (Turdus iliacus) 	2013/2014:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Marzaiola (Anas querquedula) 4. Mestolone (Anas clypeata) 5. Moriglione (Aythya ferina) 6. Moretta (Aythya fuligula) 7. Starna (Perdix Perdix) 8. Quaglia (Coturnix coturnix) 9. Pavoncella (Vanellus vanellus) 10. Combattente (Philomachus pugnax) 11. Frullino (Lymnocyptes minimus) 12. Beccaccino (Gallinago gallinago) 13. Beccaccia (Scolopax rusticola) 14. Tortora (Streptopelia turtur) 15. Allodola (Alauda arvensis)
Campania	2011/2012:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Beccaccia (Scolopax rusticola) 2. Cesena (Turdus pilaris) 3. Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 	2011/2012:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Marzaiola (Anas querquedula) 4. Mestolone (Anas clypeata) 5. Moriglione (Aythya ferina) 6. Starna (Perdix Perdix)

				<ul style="list-style-type: none"> 7. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 8. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 9. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 10. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 11. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 12. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 13. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2012/2013:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 6. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 7. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 	2012/2013:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Sarna (<i>Perdix Perdix</i>) 7. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 8. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 9. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 10. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 11. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 12. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 13. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2013/2014:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 2. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 3. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 4. Tordo Sassello (<i>Turdus iliacus</i>) 	2013/2014:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Sarna (<i>Perdix Perdix</i>) 7. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 8. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 9. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 10. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 11. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 12. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 13. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
Emilia Romagna	2011/2012:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 6. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 7. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 8. Tordo Sassello (<i>Turdus iliacus</i>) 	2011/2012:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 7. Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>) 8. Sarna (<i>Perdix Perdix</i>) 9. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 10. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>)

				<ol style="list-style-type: none"> 11. Frullino (Lymnocyptes minimus) 12. Beccaccino (Gallinago gallinago) 13. Beccaccia (Scolopax rusticola) 14. Tortora (Streptopelia turtur) 15. Allodola (Alauda arvensis)
	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (Anas crecca) 2. Canapiglia (Anas strepera) 3. Codone (Anas acuta) 4. Folaga (Fulica atra) 5. Beccaccia (Scolopax rusticola) 6. Cesena (Turdus pilaris) 7. Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Marzaiola (Anas querquedula) 4. Mestolone (Anas clypeata) 5. Moriglione (Aythya ferina) 6. Pernice rossa (Alectoris rufa) 7. Starna (Perdix Perdix) 8. Quaglia (Coturnix coturnix) 9. Pavoncella (Vanellus vanellus) 10. Frullino (Lymnocyptes minimus) 11. Beccaccino (Gallinago gallinago) 12. Beccaccia (Scolopax rusticola) 13. Tortora (Streptopelia turtur) 14. Allodola (Alauda arvensis)
	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (Anas crecca) 2. Canapiglia (Anas strepera) 3. Codone (Anas acuta) 4. Folaga (Fulica atra) 5. Beccaccia (Scolopax rusticola) 6. Cesena (Turdus pilaris) 7. Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Marzaiola (Anas querquedula) 4. Mestolone (Anas clypeata) 5. Moriglione (Aythya ferina) 6. Pernice rossa (Alectoris rufa) 7. Starna (Perdix Perdix) 8. Quaglia (Coturnix coturnix) 9. Pavoncella (Vanellus vanellus) 10. Frullino (Lymnocyptes minimus) 11. Beccaccino (Gallinago gallinago) 12. Beccaccia (Scolopax rusticola) 13. Tortora (Streptopelia turtur) 14. Allodola (Alauda arvensis)
Friuli Venezia Giulia	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Folaga (Fulica atra) 4. Combattente (Philomachus pugnax) 5. Beccaccia (Scolopax rusticola) 6. Cesena (Turdus pilaris) 7. Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 8. Tordo Sassello (Turdus iliacus) 	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Marzaiola (Anas querquedula) 4. Mestolone (Anas clypeata) 5. Moriglione (Aythya ferina) 6. Moretta (Aythya fuligula) 7. Fagiano di monte (Tetrao tetrix) 8. Pernice rossa (Alectoris rufa) 9. Starna (Perdix Perdix) 10. Quaglia (Coturnix coturnix) 11. Pavoncella (Vanellus

				vanellus) 12. Combattente (Philomacus pugnax) 13. Frullino (Lymnocyptes minimus) 14. Beccaccino (Gallinago gallinago) 15. Beccaccia (Scolopax rusticola) 16. Tortora (Streptopelia turtur) 17. Allodola (Alauda arvensis)
	2012/2013:	1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Folaga (Fulica atra) 4. Combattente (Philomacus pugnax) 5. Beccaccia (Scolopax rusticola) 6. Cesena (Turdus pilaris) 7. Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 8. Tordo Sassello (Turdus iliacus)	2012/2013:	1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Marzaiola (Anas querquedula) 4. Mestolone (Anas clypeata) 5. Moriglione (Aythya ferina) 6. Moretta (Aythya fuligula) 7. Fagiano di monte (Tetrao tetrix) 8. Pernice rossa (Alectoris rufa) 9. Starna (Perdix Perdix) 10. Quaglia (Coturnix coturnix) 11. Pavoncella (Vanellus vanellus) 12. Combattente (Philomacus pugnax) 13. Frullino (Lymnocyptes minimus) 14. Beccaccino (Gallinago gallinago) 15. Beccaccia (Scolopax rusticola) 16. Tortora (Streptopelia turtur) 17. Allodola (Alauda arvensis)
	2013/2014:	1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Folaga (Fulica atra) 4. Combattente (Philomacus pugnax) 5. Beccaccia (Scolopax rusticola) 6. Cesena (Turdus pilaris) 7. Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 8. Tordo Sassello (Turdus iliacus)	2013/2014:	1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Marzaiola (Anas querquedula) 4. Mestolone (Anas clypeata) 5. Moriglione (Aythya ferina) 6. Moretta (Aythya fuligula) 7. Fagiano di monte (Tetrao tetrix) 8. Pernice rossa (Alectoris rufa) 9. Starna (Perdix Perdix) 10. Quaglia (Coturnix coturnix) 11. Pavoncella (Vanellus vanellus) 12. Combattente (Philomacus pugnax) 13. Frullino (Lymnocyptes minimus) 14. Beccaccino (Gallinago gallinago) 15. Beccaccia (Scolopax rusticola) 16. Tortora (Streptopelia turtur) 17. Allodola (Alauda arvensis)

Lazio	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 6. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 7. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 8. Tordo Sassello (<i>Turdus iliacus</i>) 	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 7. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 8. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 9. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 10. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 11. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 12. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 13. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 6. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 7. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 8. Tordo Sassello (<i>Turdus iliacus</i>) 	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 7. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 8. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 9. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 10. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 11. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 12. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 13. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 6. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 7. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 8. Tordo Sassello (<i>Turdus iliacus</i>) 	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 7. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 8. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 9. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 10. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 11. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 12. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 13. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
Liguria	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>)

		6. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 7. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 8. Tordo Sassello (<i>Turdus iliacus</i>)		5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 7. Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>) 8. Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>) 9. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 10. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 11. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 12. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 13. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 14. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 15. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2012/2013:	1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 6. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 7. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 8. Tordo Sassello (<i>Turdus iliacus</i>)	2012/2013:	1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 7. Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>) 8. Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>) 9. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 10. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 11. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 12. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 13. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 14. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 15. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2013/2014:	1. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 2. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 3. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 4. Tordo Sassello (<i>Turdus iliacus</i>)	2013/2014:	1. Codone (<i>Anas acuta</i>) 2. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 3. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 4. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 5. Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>) 6. Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>) 7. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 8. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 9. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 10. Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>) 11. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 12. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 13. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 14. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 15. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)

Lombardia	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Combattente (<i>Philomacus pugnax</i>) 6. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 7. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 8. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 9. Tordo Sassello (<i>Turdus iliacus</i>) 	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 7. Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>) 8. Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>) 9. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 10. Sturna (<i>Perdix Perdix</i>) 11. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 12. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 13. Combattente (<i>Philomacus pugnax</i>) 14. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 15. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 16. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 17. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 18. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Combattente (<i>Philomacus pugnax</i>) 6. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 7. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 8. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 9. Tordo Sassello (<i>Turdus iliacus</i>) 	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 7. Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>) 8. Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>) 9. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 10. Sturna (<i>Perdix Perdix</i>) 11. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 12. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 13. Combattente (<i>Philomacus pugnax</i>) 14. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 15. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 16. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 17. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 18. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Combattente (<i>Philomacus pugnax</i>) 6. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 7. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 8. Tordo bottaccio (<i>Turdus</i> 	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 7. Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>)

		<p>philomelos)</p> <p>9. Tordo Sassello (Turdus iliacus)</p>		<p>8. Pernice rossa (Alectoris rufa)</p> <p>9. Coturnice (Alectoris graeca)</p> <p>10. Starna (Perdix Perdix)</p> <p>11. Quaglia (Coturnix coturnix)</p> <p>12. Pavoncella (Vanellus vanellus)</p> <p>13. Combattente (Philomacus pugnax)</p> <p>14. Frullino (Lymnocyptes minimus)</p> <p>15. Beccaccino (Gallinago gallinago)</p> <p>16. Beccaccia (Scolopax rusticola)</p> <p>17. Tortora (Streptopelia turtur)</p> <p>18. Alodola (Alauda arvensis)</p>
Marche	2011/2012:	<p>1. Alzavola (Anas crecca)</p> <p>2. Canapiglia (Anas strepera)</p> <p>3. Codone (Anas acuta)</p> <p>4. Folaga (Fulica atra)</p> <p>5. Combattente (Philomacus pugnax)</p> <p>6. Beccaccia (Scolopax rusticola)</p> <p>7. Cesena (Turdus pilaris)</p> <p>8. Tordo bottaccio (Turdus philomelos)</p> <p>9. Tordo Sassello (Turdus iliacus)</p>	2011/2012:	<p>1. Canapiglia (Anas strepera)</p> <p>2. Codone (Anas acuta)</p> <p>3. Marzaiola (Anas querquedula)</p> <p>4. Mestolone (Anas clypeata)</p> <p>5. Moriglione (Aythya ferina)</p> <p>6. Moretta (Aythya fuligula)</p> <p>7. Pernice rossa (Alectoris rufa)</p> <p>8. Coturnice (Alectoris graeca)</p> <p>9. Starna (Perdix Perdix)</p> <p>10. Quaglia (Coturnix coturnix)</p> <p>11. Pavoncella (Vanellus vanellus)</p> <p>12. Combattente (Philomacus pugnax)</p> <p>13. Frullino (Lymnocyptes minimus)</p> <p>14. Beccaccino (Gallinago gallinago)</p> <p>15. Beccaccia (Scolopax rusticola)</p> <p>16. Tortora (Streptopelia turtur)</p> <p>17. Alodola (Alauda arvensis)</p>
	2012/2013:	<p>1. Alzavola (Anas crecca)</p> <p>2. Canapiglia (Anas strepera)</p> <p>3. Codone (Anas acuta)</p> <p>4. Folaga (Fulica atra)</p> <p>5. Combattente (Philomacus pugnax)</p> <p>6. Beccaccia (Scolopax rusticola)</p> <p>7. Cesena (Turdus pilaris)</p> <p>8. Tordo bottaccio (Turdus philomelos)</p> <p>9. Tordo Sassello (Turdus iliacus)</p>	2012/2013:	<p>1. Canapiglia (Anas strepera)</p> <p>2. Codone (Anas acuta)</p> <p>3. Marzaiola (Anas querquedula)</p> <p>4. Mestolone (Anas clypeata)</p> <p>5. Moriglione (Aythya ferina)</p> <p>6. Moretta (Aythya fuligula)</p> <p>7. Pernice rossa (Alectoris rufa)</p> <p>8. Coturnice (Alectoris graeca)</p> <p>9. Starna (Perdix Perdix)</p> <p>10. Quaglia (Coturnix coturnix)</p> <p>11. Pavoncella (Vanellus vanellus)</p> <p>12. Combattente (Philomacus pugnax)</p> <p>13. Frullino (Lymnocyptes minimus)</p> <p>14. Beccaccino (Gallinago gallinago)</p> <p>15. Beccaccia (Scolopax rusticola)</p>

				rusticola) 16. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 17. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>) 6. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 7. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 8. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 9. Tordo Sassello (<i>Turdus iliacus</i>) 	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 7. Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>) 8. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 9. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 10. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 11. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 12. Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>) 13. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 14. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 15. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 16. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 17. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
Motise	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 2. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 3. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 4. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 7. Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>) 8. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 9. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 10. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 11. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 12. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 13. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 14. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 15. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 2. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 3. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 4. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>) 7. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 8. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 9. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 10. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>)

				<ul style="list-style-type: none"> 11. Beccaccino (Gallinago gallinago) 12. Beccaccia (Scolopax rusticola) 13. Tortora (Streptopelia turtur) 14. Allodola (Alauda arvensis)
	2013/2014:	NESSUNA	2013/2014:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Marzaiola (Anas querquedula) 4. Mestolone (Anas clypeata) 5. Moriglione (Aythya ferina) 6. Pernice rossa (Alectoris rufa) 7. Starna (Perdix Perdix) 8. Quaglia (Coturnix coturnix) 9. Pavoncella (Vanellus vanellus) 10. Beccaccino (Gallinago gallinago) 11. Beccaccia (Scolopax rusticola) 12. Tortora (Streptopelia turtur) 13. Allodola (Alauda arvensis)
Piemonte	2011/2012:	NESSUNA	2011/2012:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fagiano di monte (Tetrao tetrix) 2. Pernice rossa (Alectoris rufa) 3. Coturnice (Alectoris graeca) 4. Starna (Perdix Perdix) 5. Quaglia (Coturnix coturnix) 6. Beccaccino (Gallinago gallinago) 7. Beccaccia (Scolopax rusticola) 8. Tortora (Streptopelia turtur)
	2012/2013:	1. Alzavola (Anas crecca)	2012/2013:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fagiano di monte (Tetrao tetrix) 2. Pernice rossa (Alectoris rufa) 3. Coturnice (Alectoris graeca) 4. Starna (Perdix Perdix) 5. Quaglia (Coturnix coturnix) 6. Pavoncella (Vanellus vanellus) 7. Beccaccino (Gallinago gallinago) 8. Beccaccia (Scolopax rusticola) 9. Tortora (Streptopelia turtur) 10. Allodola (Alauda arvensis)
	2013/2014:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (Anas crecca) 2. Folaga (Fulica atra) 3. Cesena (Turdus pilaris) 	2013/2014:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Fagiano di monte (Tetrao tetrix) 2. Pernice rossa (Alectoris rufa) 3. Coturnice (Alectoris graeca) 4. Starna (Perdix Perdix) 5. Quaglia (Coturnix coturnix) 6. Beccaccino (Gallinago gallinago) 7. Beccaccia (Scolopax rusticola) 8. Tortora (Streptopelia turtur)

Puglia	2011/2012:	1. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 2. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 3. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)	2011/2012:	9. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>) 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 4. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 5. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 6. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 7. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 8. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 9. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 10. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 11. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 12. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2012/2013:	1. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 2. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 3. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)	2012/2013:	1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 4. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 5. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 6. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 7. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 8. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 9. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 10. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 11. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 12. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2013/2014:	1. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 2. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 3. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)	2013/2014:	1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 4. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 5. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 6. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 7. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 8. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 9. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 10. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 11. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 12. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
Sardegna	2011/2012:	1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>) 6. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 7. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 8. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>)	2011/2012:	1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 4. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 5. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 6. Pernice sarda (<i>Alectoris barbara</i>) 7. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 8. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>)

		9. Tordo Sassello (Turdus iliacus)		9. Frullino (Lymnocyptes minimus) 10. Beccaccino (Gallinago gallinago) 11. Beccaccia (Scolopax rusticola) 12. Tortora (Streptopelia turtur) 13. Allodola (Alauda arvensis)
	2012/2013:	1. Alzavola (Anas crecca) 2. Canapiglia (Anas strepera) 3. Codone (Anas acuta) 4. Folaga (Fulica atra) 5. Combattente (Philomachus pugnax) 6. Beccaccia (Scolopax rusticola) 7. Cesena (Turdus pilaris) 8. Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 9. Tordo Sassello (Turdus iliacus)	2012/2013:	1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Mestolone (Anas clypeata) 4. Moriglione (Aythya ferina) 5. Pemice sarda (Alectoris barbara) 6. Quaglia (Coturnix coturnix) 7. Pavoncella (Vanellus vanellus) 8. Frullino (Lymnocyptes minimus) 9. Beccaccino (Gallinago gallinago) 10. Beccaccia (Scolopax rusticola) 11. Tortora (Streptopelia turtur) 12. Allodola (Alauda arvensis)
	2013/2014:	1. Alzavola (Anas crecca) 2. Canapiglia (Anas strepera) 3. Codone (Anas acuta) 4. Folaga (Fulica atra) 5. Beccaccia (Scolopax rusticola)	2013/2014:	1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Mestolone (Anas clypeata) 4. Moriglione (Aythya ferina) 5. Pemice sarda (Alectoris barbara) 6. Quaglia (Coturnix coturnix) 7. Pavoncella (Vanellus vanellus) 8. Frullino (Lymnocyptes minimus) 9. Beccaccino (Gallinago gallinago) 10. Beccaccia (Scolopax rusticola) 11. Tortora (Streptopelia turtur) 12. Allodola (Alauda arvensis)
Sicilia	2011/2012:	NESSUNA	2011/2012:	1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Mestolone (Anas clypeata) 4. Moriglione (Aythya ferina) 5. Quaglia (Coturnix coturnix) 6. Pavoncella (Vanellus vanellus) 7. Beccaccino (Gallinago gallinago) 8. Beccaccia (Scolopax rusticola) 9. Tortora (Streptopelia turtur) 10. Allodola (Alauda arvensis)
	2012/2013:	1. Alzavola (Anas crecca) 2. Canapiglia (Anas strepera) 3. Codone (Anas acuta) 4. Folaga (Fulica atra)	2012/2013:	1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Mestolone (Anas clypeata) 4. Moriglione (Aythya ferina)

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 6. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 7. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 8. Tordo Sassello (<i>Turdus iliacus</i>) 		<ol style="list-style-type: none"> 5. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 6. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 7. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 8. Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>) 9. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 10. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 11. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 12. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 4. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 5. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 6. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 7. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 8. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 9. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 10. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
Toscana	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>) 6. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 7. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 8. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 9. Tordo Sassello (<i>Turdus iliacus</i>) 	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 7. Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>) 8. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 9. Starna (<i>Perdix perdix</i>) 10. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 11. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 12. Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>) 13. Frullino (<i>Lymnocryptes minimus</i>) 14. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 15. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 16. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 17. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>) 6. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 7. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 8. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 9. Tordo Sassello (<i>Turdus</i>) 	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 7. Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>) 8. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 9. Starna (<i>Perdix perdix</i>) 10. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>)

		iliacus)		<ol style="list-style-type: none"> 11. Pavoncella (Vanellus vanellus) 12. Combattente (Philomachus pugnax) 13. Frullino (Lymnocyptes minimus) 14. Beccaccino (Gallinago gallinago) 15. Beccaccia (Scolopax rusticola) 16. Tortora (Streptopelia turtur) 17. Allodola (Alauda arvensis)
	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (Anas crecca) 2. Canapiglia (Anas strepera) 3. Codone (Anas acuta) 4. Folaga (Fulica atra) 5. Beccaccia (Scolopax rusticola) 6. Cesena (Turdus pilaris) 7. Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 8. Tordo Sassello (Turdus iliacus) 	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Marzaiola (Anas querquedula) 4. Mestolone (Anas clypeata) 5. Moriglione (Aythya ferina) 6. Moretta (Aythya fuligula) 7. Pernice rossa (Alectoris rufa) 8. Coturnice (Alectoris graeca) 9. Starna (Perdix Perdix) 10. Quaglia (Coturnix coturnix) 11. Pavoncella (Vanellus vanellus) 12. Combattente (Philomachus pugnax) 13. Frullino (Lymnocyptes minimus) 14. Beccaccino (Gallinago gallinago) 15. Beccaccia (Scolopax rusticola) 16. Tortora (Streptopelia turtur) 17. Allodola (Alauda arvensis)
Umbria	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (Anas crecca) 2. Canapiglia (Anas strepera) 3. Codone (Anas acuta) 4. Folaga (Fulica atra) 5. Beccaccia (Scolopax rusticola) 6. Cesena (Turdus pilaris) 7. Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 8. Tordo Sassello (Turdus iliacus) 	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Marzaiola (Anas querquedula) 4. Mestolone (Anas clypeata) 5. Moriglione (Aythya ferina) 6. Moretta (Aythya fuligula) 7. Pernice rossa (Alectoris rufa) 8. Coturnice (Alectoris graeca) 9. Starna (Perdix Perdix) 10. Quaglia (Coturnix coturnix) 11. Pavoncella (Vanellus vanellus) 12. Frullino (Lymnocyptes minimus) 13. Beccaccino (Gallinago gallinago) 14. Beccaccia (Scolopax rusticola) 15. Tortora (Streptopelia turtur) 16. Allodola (Alauda arvensis)
	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (Anas crecca) 2. Canapiglia (Anas strepera) 3. Codone (Anas acuta) 	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Codone (Anas acuta) 3. Marzaiola (Anas)

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 6. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 7. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 8. Tordo Sassetto (<i>Turdus iliacus</i>) 		<ol style="list-style-type: none"> 4. querquedula) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 7. Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>) 8. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 9. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 10. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 11. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 12. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 13. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 14. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 15. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 16. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 6. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 7. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 8. Tordo Sassetto (<i>Turdus iliacus</i>) 	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 7. Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>) 8. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 9. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 10. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 11. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 12. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 13. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 14. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 15. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 16. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
Valle d'Aosta	2011/2012:	NESSUNA	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>) 2. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 3. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 4. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 5. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)
	2012/2013:	NESSUNA	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>) 2. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 3. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 4. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 5. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)
	2013/2014:	NESSUNA	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>) 2. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 3. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 4. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)

Veneto	2011/2012:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 6. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 7. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 7. Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>) 8. Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>) 9. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 10. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 11. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 12. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 13. Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>) 14. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 15. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 16. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 17. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 18. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2012/2013:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 6. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 7. Tordo bottaccio (<i>Turdus philomelos</i>) 8. Tordo Sassello (<i>Turdus iliacus</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 2012/2013: 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 7. Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>) 8. Pernice rossa (<i>Alectoris rufa</i>) 9. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 10. Starna (<i>Perdix Perdix</i>) 11. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 12. Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>) 13. Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>) 14. Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) 15. Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) 16. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 17. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 18. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
	2013/2014:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alzavola (<i>Anas crecca</i>) 2. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 3. Codone (<i>Anas acuta</i>) 4. Folaga (<i>Fulica atra</i>) 5. Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>) 6. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) 7. Cesena (<i>Turdus pilaris</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 2013/2014: 1. Canapiglia (<i>Anas strepera</i>) 2. Codone (<i>Anas acuta</i>) 3. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 4. Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) 5. Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) 6. Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) 7. Fagiano di monte (<i>Tetrao</i>)

		8. Tordo bottaccio (Turdus philomelos) 9. Tordo Sassello (Turdus iliacus)		8. Pernice rossa (Alectoris rufa) 9. Coturnice (Alectoris graeca) 10. Starna (Perdix Perdix) 11. Quaglia (Coturnix coturnix) 12. Pavoncella (Vanellus vanellus) 13. Combattente (Philomachus pugnax) 14. Frullino (Lymnocyptes minimus) 15. Beccaccino (Gallinago gallinago) 16. Beccaccia (Scolopax rusticola) 17. Tortora (Streptopelia turtur) 18. Alodola (Alauda arvensis)
Provincia Autonoma di Trento	2011/2012:	1. Alzavola (Anas crecca) 2. Canapiglia (Anas strepera) 3. Cesena (Turdus pilaris) 4. Tordo Sassello (Turdus iliacus)	2011/2012:	1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Marzaiola (Anas querquedula) 3. Moriglione (Aythya ferina) 4. Moretta (Aythya fuligula) 5. Fagiano di monte (Tetrao tetrix) 6. Coturnice (Alectoris graeca) 7. Starna (Perdix Perdix) 8. Beccaccino (Gallinago gallinago) 9. Beccaccia (Scolopax rusticola) 10. Tortora (Streptopelia turtur) 11. Alodola (Alauda arvensis)
	2012/2013:	1. Alzavola (Anas crecca) 2. Canapiglia (Anas strepera) 3. Cesena (Turdus pilaris) 4. Tordo Sassello (Turdus iliacus)	2012/2013:	1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Marzaiola (Anas querquedula) 3. Moriglione (Aythya ferina) 4. Moretta (Aythya fuligula) 5. Fagiano di monte (Tetrao tetrix) 6. Coturnice (Alectoris graeca) 7. Starna (Perdix Perdix) 8. Beccaccino (Gallinago gallinago) 9. Beccaccia (Scolopax rusticola) 10. Tortora (Streptopelia turtur) 11. Alodola (Alauda arvensis)
	2013/2014:	1. Alzavola (Anas crecca) 2. Canapiglia (Anas strepera) 3. Cesena (Turdus pilaris) 4. Tordo Sassello (Turdus iliacus)	2013/2014:	1. Canapiglia (Anas strepera) 2. Marzaiola (Anas querquedula) 3. Moriglione (Aythya ferina) 4. Moretta (Aythya fuligula) 5. Fagiano di monte (Tetrao tetrix) 6. Coturnice (Alectoris graeca) 7. Starna (Perdix Perdix) 8. Beccaccino (Gallinago gallinago) 9. Beccaccia (Scolopax rusticola)

				rusticola) 10. Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>) 11. Allodola (<i>Alauda arvensis</i>)
Provincia Autonoma di Bolzano	2011/2012:	NESSUNA	2011/2012:	1. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 2. Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>) 3. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 4. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)
	2012/2013:	NESSUNA	2012/2013:	1. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 2. Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>) 3. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 4. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)
	2013/2014:	NESSUNA	2013/2014:	1. Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>) 2. Fagiano di monte (<i>Tetrao tetrix</i>) 3. Coturnice (<i>Alectoris graeca</i>) 4. Quaglia (<i>Coturnix coturnix</i>) 5. Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)

Pozzilli Patrizia

ANTICIPATO AREA I

Da: struttura infrazioni Politiche Europee [struttura@politicheeuropee.it]
Inviato: lunedì 6 ottobre 2014 14.28
A: UL Segreteria Ufficio Legislativo; A: PNM-UDG; 'genovesi.piero@minambiente.it'
Cc: Segreteria Capodipartimento Affari Regionali; 'Andrea Ciaffi'; 'giur@rpue.esteri.it'
Oggetto: Caso UE PILOT 6955/14/ENVI -Calendari venatori. Rispetto degli articoli 2,5, e 7 della Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Allegati: Richiesta EU Pilot.pdf

Si invia la nota allegata relativa al caso in oggetto.
Cordialmente,

SEGRETERIA

*Struttura di missione per le Procedure di infrazione
Dipartimento Politiche Europee
Presidenza del Consiglio dei Ministri
L.go Chigi, 19 - 00187 ROMA
Tel. +39 06 67795208
Fax +39 06 67795194*