Federazione Italiana della Caccia

Sezione della Venezia Giulia

Ricerca sulla femmina di Capriolo

*NB Inserire il numero, per ciascuna uscita, delle femmine di Capriolo osservate anche se poi c'è stato un abbattimento. I caprioli nascono, di norma, il 13 maggio. Una femmina osservata il **12 maggio** di quest'anno è nata l'anno precedente, **quindi ha MENO DI UN ANNO** !*

Osservazione n.		Data	
Non bene identificata			
DA SOLA e di meno di 12 mesi			
"Sottile" (che non ha MAI partorito)			
Evidentemente incinta			
Ha probabilmente partorito, senza piccoli			
Senza piccoli		Con UN piccolo	
Con DUE piccoli		Con TRE piccoli	
Abbattuta una femmina di classe	0, 1, 2+		NO

Note:

Rilevatore : Nome e COGNOME

Riserva di : oppure indirizzo

Federazione Italiana della Caccia

Sezione della Venezia Giulia

Ricerca sulla femmina di Capriolo

*NB Inserire il numero, per ciascuna uscita, delle femmine di Capriolo osservate anche se poi c'è stato un abbattimento. I caprioli nascono, di norma, il 13 maggio. Una femmina osservata il **12 maggio** di quest'anno è nata l'anno precedente, **quindi ha MENO DI UN ANNO** !*

Osservazione n.		Data	
Non bene identificata			
DA SOLA e di meno di 12 mesi			
"Sottile" (che non ha MAI partorito)			
Evidentemente incinta			
Ha probabilmente partorito, senza piccoli			
Senza piccoli		Con UN piccolo	
Con DUE piccoli		Con TRE piccoli	
Abbattuta una femmina di classe	0, 1, 2+		NO

Note:

Rilevatore : Nome e COGNOME

Riserva di : oppure indirizzo

Federazione Italiana della Caccia

Sezione della Venezia Giulia

Ricerca sulla femmina di Capriolo

*NB Inserire il numero, per ciascuna uscita, delle femmine di Capriolo osservate anche se poi c'è stato un abbattimento. I caprioli nascono, di norma, il 13 maggio. Una femmina osservata il **12 maggio** di quest'anno è nata l'anno precedente, **quindi ha MENO DI UN ANNO** !*

Osservazione n.		Data	
Non bene identificata			
DA SOLA e di meno di 12 mesi			
"Sottile" (che non ha MAI partorito)			
Evidentemente incinta			
Ha probabilmente partorito, senza piccoli			
Senza piccoli		Con UN piccolo	
Con DUE piccoli		Con TRE piccoli	
Abbattuta una femmina di classe	0, 1, 2+		NO

Note:

Rilevatore : Nome e COGNOME

Riserva di : oppure indirizzo

Federazione Italiana della Caccia

Sezione della Venezia Giulia

Ricerca sulla femmina di Capriolo

*NB Inserire il numero, per ciascuna uscita, delle femmine di Capriolo osservate anche se poi c'è stato un abbattimento. I caprioli nascono, di norma, il 13 maggio. Una femmina osservata il **12 maggio** di quest'anno è nata l'anno precedente, **quindi ha MENO DI UN ANNO** !*

Osservazione n.		Data	
Non bene identificata			
DA SOLA e di meno di 12 mesi			
"Sottile" (che non ha MAI partorito)			
Evidentemente incinta			
Ha probabilmente partorito, senza piccoli			
Senza piccoli		Con UN piccolo	
Con DUE piccoli		Con TRE piccoli	
Abbattuta una femmina di classe	0, 1, 2+		NO

Note:

Rilevatore : Nome e COGNOME

Riserva di : oppure indirizzo

Federazione Italiana della Caccia

Sezione della Venezia Giulia

Ricerca sulla femmina di Capriolo

*NB Inserire il numero, per ciascuna uscita, delle femmine di Capriolo osservate anche se poi c'è stato un abbattimento. I caprioli nascono, di norma, il 13 maggio. Una femmina osservata il **12 maggio** di quest'anno è nata l'anno precedente, **quindi ha MENO DI UN ANNO** !*

Osservazione n.		Data	
Non bene identificata			
DA SOLA e di meno di 12 mesi			
"Sottile" (che non ha MAI partorito)			
Evidentemente incinta			
Ha probabilmente partorito, senza piccoli			
Senza piccoli		Con UN piccolo	
Con DUE piccoli		Con TRE piccoli	
Abbattuta una femmina di classe	0, 1, 2+		NO

Note:

Rilevatore : Nome e COGNOME

Riserva di : oppure indirizzo

Federazione Italiana della Caccia

Sezione della Venezia Giulia

Ricerca sulla femmina di Capriolo

*NB Inserire il numero, per ciascuna uscita, delle femmine di Capriolo osservate anche se poi c'è stato un abbattimento. I caprioli nascono, di norma, il 13 maggio. Una femmina osservata il **12 maggio** di quest'anno è nata l'anno precedente, **quindi ha MENO DI UN ANNO** !*

Osservazione n.		Data	
Non bene identificata			
DA SOLA e di meno di 12 mesi			
"Sottile" (che non ha MAI partorito)			
Evidentemente incinta			
Ha probabilmente partorito, senza piccoli			
Senza piccoli		Con UN piccolo	
Con DUE piccoli		Con TRE piccoli	
Abbattuta una femmina di classe	0, 1, 2+		NO

Note:

Rilevatore : Nome e COGNOME

Riserva di : oppure indirizzo

Federazione Italiana della Caccia

Sezione della Venezia Giulia

Ricerca sulla femmina di Capriolo

*NB Inserire il numero, per ciascuna uscita, delle femmine di Capriolo osservate anche se poi c'è stato un abbattimento. I caprioli nascono, di norma, il 13 maggio. Una femmina osservata il **12 maggio** di quest'anno è nata l'anno precedente, **quindi ha MENO DI UN ANNO** !*

Osservazione n.		Data	
Non bene identificata			
DA SOLA e di meno di 12 mesi			
"Sottile" (che non ha MAI partorito)			
Evidentemente incinta			
Ha probabilmente partorito, senza piccoli			
Senza piccoli		Con UN piccolo	
Con DUE piccoli		Con TRE piccoli	
Abbattuta una femmina di classe	0, 1, 2+		NO

Note:

Rilevatore : Nome e COGNOME

Riserva di : oppure indirizzo

Federazione Italiana della Caccia

Sezione della Venezia Giulia

Ricerca sulla femmina di Capriolo

*NB Inserire il numero, per ciascuna uscita, delle femmine di Capriolo osservate anche se poi c'è stato un abbattimento. I caprioli nascono, di norma, il 13 maggio. Una femmina osservata il **12 maggio** di quest'anno è nata l'anno precedente, **quindi ha MENO DI UN ANNO** !*

Osservazione n.		Data	
Non bene identificata			
DA SOLA e di meno di 12 mesi			
"Sottile" (che non ha MAI partorito)			
Evidentemente incinta			
Ha probabilmente partorito, senza piccoli			
Senza piccoli		Con UN piccolo	
Con DUE piccoli		Con TRE piccoli	
Abbattuta una femmina di classe	0, 1, 2+		NO

Note:

Rilevatore : Nome e COGNOME

Riserva di : oppure indirizzo

Federazione Italiana della Caccia

Sezione della Venezia Giulia

Ricerca sulla femmina di Capriolo

*NB Inserire il numero, per ciascuna uscita, delle femmine di Capriolo osservate anche se poi c'è stato un abbattimento. I caprioli nascono, di norma, il 13 maggio. Una femmina osservata il **12 maggio** di quest'anno è nata l'anno precedente, **quindi ha MENO DI UN ANNO** !*

Osservazione n.		Data	
Non bene identificata			
DA SOLA e di meno di 12 mesi			
"Sottile" (che non ha MAI partorito)			
Evidentemente incinta			
Ha probabilmente partorito, senza piccoli			
Senza piccoli		Con UN piccolo	
Con DUE piccoli		Con TRE piccoli	
Abbattuta una femmina di classe	0, 1, 2+		NO

Note:

Rilevatore : Nome e COGNOME

Riserva di : oppure indirizzo